

		Quantidade de água a aplicar semanalmente através do sistema de rega (mm)															
		Data de Sementeira															
		01/04/2023			15/04/2023			01/05/2023			15/05/2023			01/06/2023			
Estação	ETo (mm)	P (mm)	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.
Alpiarça	36,1	0,0	48	51	49	48	51	49	43	46	44	36	38	37	26	28	27
Pinheiro Grande	40,9	0,0	55	58	55	55	58	55	49	52	49	41	43	41	28	30	29
Riachos	42,3	0,0	56	60	57	56	60	57	51	53	51	42	45	43	28	30	29
Barrosa	38,7	0,0	52	55	52	52	55	52	46	49	47	39	41	39	28	30	29
Coruche	37,9	0,0	51	54	51	51	54	51	45	48	46	38	40	38	28	29	28
Couço	44,2	0,0	59	62	60	59	62	60	53	56	53	44	47	45	31	33	32
Magos	37,6	0,0	50	53	51	50	53	51	45	48	46	38	40	38	28	29	28
Maranhão	42,5	0,0	57	60	57	57	60	57	51	54	51	43	45	43	30	32	31
Montargil	40,7	0,0	54	57	55	54	57	55	48	51	49	41	43	41	29	30	29

Notas:

- (1) **As recomendações de rega supra indicadas baseiam-se na monitorização climática e na estimativa da ETo da semana anterior**
- (2) ETo - Evapotranspiração de referência (mm) ; P - Precipitação ocorrida no período (mm).
- (3) Caso não tenha havido precipitação na sua exploração, deverá acrescentar a precipitação referida no quadro, à dotação de rega a aplicar.
- (4) Para efeitos dos cálculos das necessidades de água a aplicar foram consideradas as seguintes eficiência de rega: Gota a Gota 90%, Aspersão Pivot 85% e Gravidade 60%. Em caso de dúvida, recomenda-se a avaliação do sistema de rega.
- (5) Para o cálculo da quantidade de água a aplicar, considera-se apenas 80% da precipitação ocorrida no período.
- (6) Na determinação das necessidades em água considerou-se um ciclo cultural com uma duração de 150 dias.

Comentários:

A dotação de rega recomendada a aplicar no milho sob condições ótimas é disponibilizada no quadro para a área de influência de cada estação meteoro lógica. O milho com sementeira de 01 a 15 de abril está na fase mais sensível em necessidades de água (fase intermédia – entre a floração e o início da maturação), o milho com sementeira entre 01 de maio e 01 de junho encontra-se na fase de desenvolvimento rápido em que as necessidades de água são crescentes.