

Quantidade de água a aplicar semanATmente através do sistema de rega (mm)																	
Data de Sementeira																	
Estação	ETo (mm)	P (mm)	15/04/2024			01/05/2024			15/05/2024			01/06/2024			15/06/2024		
			Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.
Alpiarça	29,0	0,0	34	36	41	28	30	34	22	23	26	22	23	26	22	23	26
Pinheiro Grande	35,8	0,0	42	45	51	35	37	42	26	28	32	26	27	31	26	27	31
Riachos	30,6	1,4	35	37	42	29	30	34	22	23	26	21	22	25	21	22	25
Barrosa	33,3	0,0	39	42	47	32	34	39	25	27	31	24	25	29	24	25	29
Coruche	34,9	0,0	41	44	50	34	36	41	27	28	32	25	27	30	25	27	30
Couço	36,6	0,0	43	46	52	36	38	43	28	29	33	27	28	32	27	28	32
Magos	31,7	0,0	37	40	45	31	33	37	24	26	29	23	24	28	23	24	28
Maranhão	35,2	0,0	42	44	50	34	36	41	27	29	32	26	28	31	26	28	31
Montargil	31,7	0,0	38	40	45	31	32	37	24	26	29	24	25	28	24	25	28

### Notas:

- (1) **As recomendações de rega supra indicadas baseiam-se na monitorização climática e na estimativa da ETo da semana anterior.**
- (2) ETo - Evapotranspiração de referência (mm) ; P - Precipitação ocorrida no período (mm).
- (3) Caso não tenha havido precipitação na sua exploração, deverá acrescentar a precipitação referida no quadro, à dotação de rega a aplicar.
- (4) Para efeitos dos cálculos das necessidades de água a aplicar foram consideradas as seguintes eficiência de rega: Gota a Gota 90%, Aspersão Pivot 85% e Gravidade 60%. Em caso de dúvida, recomenda-se a avaliação do sistema de rega.
- (5) Para o cálculo da quantidade de água a aplicar, considera-se apenas 80% da precipitação ocorrida no período.
- (6) Na determinação das necessidades em água considerou-se um ciclo cultural com uma duração de 135 dias.

### Comentários:

A dotação de rega recomendada a aplicar no milho sob condições ótimas é disponibilizada no quadro para a área de influência de cada estação meteorológica. O milho com sementeira entre 01 e 16 de junho encontra-se na fase inicial em que as necessidades de rega são mais baixas. No início desta fase deve-se fazer a gestão da rega de modo a garantir a emergência da cultura. E o milho com sementeira entre 15 de abril e 15 de maio está na fase de desenvolvimento rápido em que as necessidades de rega são crescentes.